

## 食道癌 シスプラチン + 5-FU 療法

|         |                           |                |       |
|---------|---------------------------|----------------|-------|
| 患者名(漢字) | 身長                        | cm             | 担当薬剤師 |
|         | 体重                        | kg             |       |
| 主治医     | 体表面積                      | m <sup>2</sup> |       |
|         | ※身長・体重を入力すると体表面積は自動計算されます |                |       |
|         | 24hrCcr                   | mL/min         |       |

## 基本スケジュール

| 薬剤名          | 標準投与量                 | 計算値 | 実施投与量 | 投与日    |
|--------------|-----------------------|-----|-------|--------|
| シスプラチン注      | 80 mg/m <sup>2</sup>  |     | mg    | day1   |
| 5-FU注        | 800 mg/m <sup>2</sup> |     | mg    | day1-5 |
| ※投与間隔は4週1回投与 |                       |     |       |        |

## 投与日スケジュール(day1) (入院時、①②⑥⑧⑨⑩は前日病棟に払出)

| Rp | 処方内容                                                                                   | 投与時間            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ①  | ラクテック500mL                                                                             | 2時間点滴静注         |
| ②  | ラクテック500mL                                                                             | 2時間点滴静注         |
| ③  | グラニセロン静注液シリンジ(3mg)1本+生食50mL                                                            | 15分点滴静注         |
| ④  | シスプラチン注(50mg/100mL) V<br>シスプラチン注(25mg/50mL) V<br>シスプラチン注(10mg/20mL) V<br>+ 生食250mL 1 V | 2時間点滴静注<br>※要遮光 |
| ⑤  | 5-FU注(250mg) A<br>+ 生食500mL (シスプラチン終了後から開始)                                            | 24時間点滴静注        |
| ⑥  | マンニゲン注射液200mL                                                                          | 1時間点滴静注         |
| ⑦  | デキサート注(8mg)2V+生食100mL                                                                  | 30分点滴静注         |
| ⑧  | ヴィーンD500mL                                                                             | 2時間点滴静注         |
| ⑨  | ソルデム3A500mL                                                                            | 2時間点滴静注         |
| ⑩  | ヴィーンD500mL                                                                             | 2時間点滴静注         |

## 投与日スケジュール(day2～day5)

| Rp | 処方内容                        | 投与時間     |
|----|-----------------------------|----------|
| ①  | 5-FU注(250mg) A<br>+ 生食500mL | 24時間点滴静注 |

## 投与予定日

| クール | day1 | day2 | day3 | day4 | day5 |
|-----|------|------|------|------|------|
|     | 月 日  | 月 日  | 月 日  | 月 日  | 月 日  |
|     |      |      |      |      |      |
| クール | day1 | day2 | day3 | day4 | day5 |
|     | 月 日  | 月 日  | 月 日  | 月 日  | 月 日  |
|     |      |      |      |      |      |

## 注意事項

- \* 投与開始後1時間はバイタルサインチェックする。特に開始10分以内は過敏症の発現に注意。
- \* 血管外漏出がないか確認する。

(外来)1部カルテに貼り、写し2部を中央化療室へ提出。指示変更の都度発行する。

(入院)1部カルテに貼り、写し1部を薬剤部へ提出。指示変更の都度発行する。