

結腸直腸癌 XELOX療法			
患者名(漢字)	身長	cm	担当薬剤師
	体重	kg	
主治医	体表面積	m ²	※身長・体重を入力すると体表面積は自動計算されます

基本スケジュール

薬剤	標準投与量	単位	薬剤投与量	投与日
エルプラット注	130 mg/m ²	mg	mg	day1
ゼローダ錠(300mg)	BSA < 1.36m ² 1200mg/回 1.36m ² ≤ BSA < 1.66m ² 1500mg/回 1.66m ² ≤ BSA < 1.96m ² 1800mg/回 1.96m ² ≤ BSA 2100mg/回	mg/回	mg/回	day1 夕～ day15 朝 14日間内服 (7日間休薬)
1日2回 朝夕食後				
※投与間隔は3週間ごと 効果が持続する限り継続				

投与日スケジュール

投与日	投与内容	投与時間	投与日
①	デキサート注(8mg)1V + グラニセロン静注液シリンジ(3mg)1本 + 生食50mL	15分点滴静注	メイン
②	カルチコール注(5mL)1A + 硫酸マグネシウム(20mL) 0.5A + 生食50mL	15分点滴静注	メイン
③	エルプラット注100mg V エルプラット注50mg V + 5%ブドウ糖注250mL	2時間点滴静注	メイン
④	カルチコール注(5mL)1A + 硫酸マグネシウム(20mL) 0.5A + 生食50mL	15分点滴静注	メイン

投与予定日

1	エルプラット 投与開始	ゼローダ終了	4	エルプラット 投与開始	ゼローダ終了
	day1	day15		day1	day15
	年 月 日	年 月 日		年 月 日	年 月 日
2	エルプラット 投与開始	ゼローダ終了	5	エルプラット 投与開始	ゼローダ終了
	day1	day15		day1	day15
	年 月 日	年 月 日		年 月 日	年 月 日
3	エルプラット 投与開始	ゼローダ終了	6	エルプラット 投与開始	ゼローダ終了
	day1	day15		day1	day15
	年 月 日	年 月 日		年 月 日	年 月 日

注意事項

* 投与開始後1時間はバイタルサインチェックする。特に開始10分以内は過敏症の発現に注意。

* 血管外漏出がないか確認する。

(外来)1部カルテに貼り、写し2部を中央化療室へ提出。指示変更の都度発行する。

(入院)1部カルテに貼り、写し1部を薬剤部へ提出。指示変更の都度発行する。