

結腸直腸癌 XELOX+BV療法			
患者名(漢字)	身長	cm	担当薬剤師
	体重	kg	
主治医	体表面積	m ²	※身長・体重を入力すると体表面積は自動計算されます

基本スケジュール

薬剤	用量	単位	実施投与量	投与回
アバスチン注	7.5 mg/kg	mg	mg	day1
エルプラット注	130 mg/m ²	mg	mg	day1
ゼローダ錠(300mg)	BSA<1.36m ² 1200mg/回 1.36m ² ≤BSA<1.66m ² 1500mg/回 1.66m ² ≤BSA<1.96m ² 1800mg/回 1.96m ² ≤BSA 2100mg/回	mg/回	mg/回	day1 夕～ day15 朝 14日間内服 (7日間休業)

※投与間隔は3週間ごと 効果が持続する限り継続

投与日スケジュール

投与日	投与内容	投与時間	投与ル
①	アバスチン注400mg V アバスチン注100mg V + 生食100mL	90分点滴静注 2回目は60分 3回目以降は30分で可	メイン
②	生食50mL (ラインフラッシュ用)	15分点滴静注	メイン
③	デキサート注(8mg)1V + グラニセロン静注液シリンジ(3mg)1本 + 生食50mL	15分点滴静注	メイン
④	カルチコール注(5mL)1A + 硫酸マグネシウム(20mL) 0.5A + 生食50mL	15分点滴静注	メイン
⑤	エルプラット注100mg V エルプラット注50mg V + 5%ブドウ糖注250mL	2時間点滴静注	メイン
⑥	カルチコール注(5mL)1A + 硫酸マグネシウム(20mL) 0.5A + 生食50mL	15分点滴静注	メイン

投与予定日

1	アバスチン注/エルプラット注 ゼローダ錠開始		4	アバスチン注/エルプラット注 ゼローダ錠終了	
	day1	day15		day1	day15
	年 月 日	年 月 日		年 月 日	年 月 日
2	アバスチン注/エルプラット注 ゼローダ錠開始		5	アバスチン注/エルプラット注 ゼローダ錠終了	
	day1	day15		day1	day15
	年 月 日	年 月 日		年 月 日	年 月 日
3	アバスチン注/エルプラット注 ゼローダ錠開始		6	アバスチン注/エルプラット注 ゼローダ錠終了	
	day1	day15		day1	day15
	年 月 日	年 月 日		年 月 日	年 月 日

注意事項

- * 投与開始後1時間はバイタルサインチェックする。特に開始10分以内は過敏症の発現に注意。
 - * 血管外漏出がないか確認する。
- (外来)1部カルテに貼り、写し2部を中央化療室へ提出。指示変更の都度発行する。
(入院)1部カルテに貼り、写し1部を薬剤部へ提出。指示変更の都度発行する。