

レジメンNo.	92 BRECO02	パクリタキセル+トラスツマブ療法	適応病名: 乳がん					
		診療科: 乳腺・内分泌外科	根拠文献:					
		1コースの日数: 21日	最大コース数:					
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day		
						1	8	15
1	制吐剤	デキサメタゾン注	6.6 mg	点滴静注	30 min	○	○	○
	抗アレルギー	ファモチジン注	20 mg			○	○	○
	抗アレルギー	d-クロルフェニラミン注	5 mg			○	○	○
		生理食塩液	100 mL					
2	抗がん剤	パクリタキセル注	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60 min	○	○	○
		生理食塩液	250 mL					
3	抗がん剤	トラスツマブ注(遺伝子組換え)	4 mg/kg(初回)	点滴静注	90 min(初回)	○		
			2 mg/kg(2回目以降)		30 min(2回目以降)		○	○
		生理食塩液	250 mL					

レジメンNo.	92 BRECO04	CMF療法(エンドキサン点滴法)	適応病名: 乳がん				
		診療科: 乳腺・内分泌外科	根拠文献:				
		1コースの日数: 28日	最大コース数: コース				
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day	
						1	8
1	制吐剤	グラニセトロンバッグ	3 mg	点滴静注	15 min	○	○
2	抗がん剤	シクロホスファミド注	300 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30 min	○	○
		生理食塩液	100 mL				
3	抗がん剤	メソトレキセート注	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15 min	○	○
		生理食塩液	50 mL				
4	抗がん剤	フルオロウラシル注	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15 min	○	○
		生理食塩液	50 mL				

レジメンNo.	92 BRECO08	AC療法	適応病名: 乳がん						
		診療科: 乳腺・内分泌外科	根拠文献: J Clin Oncol. 1990 8 (9):1483-1496						
		1コースの日数: 21日	最大コース数: 4コース						
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day			
						1	2	3	4
1	制吐剤	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注	15 min	○			
		デキサメタゾン注	6.6 mg						
2	抗がん剤	ドキソルピシン注	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15 min	○			
		生理食塩液	50 mL						

3	抗がん剤	シクロホスファミド注 生理食塩液	600 mg/m <sup>2</sup> 100 mL	点滴静注	30 min	○				
4	制吐剤	アプレピタントカプセル	125 mg/回	経口	1日1回	○				
5	制吐剤	アプレピタントカプセル	80 mg/回	経口	1日1回		○	○		
						day				
						1	2	3	4	
6	制吐剤	デキサメタゾン錠	4 mg/回	経口	1日2回		○	○	○	

レジメンNo.	92 BRECO09	<u>パクリタキセルweekly療法</u>	適応病名: 乳がん						
		診療科: 乳腺・内分泌外科	根拠文献: J Clin Oncol. 2001 19 (22):4216-4223						
		1コースの日数: 21日	最大コース数: なし						
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day			
						1	8	15	
1	制吐剤	デキサメタゾン注	6.6 mg	点滴静注	30 min	○	○	○	
	抗アレルギー	ファモチジン注	20 mg			○	○	○	
	抗アレルギー	d-クロルフェニラミン注	5 mg			○	○	○	
		生理食塩液	100 mL						
2	抗がん剤	パクリタキセル注	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60 min	○	○	○	
		生理食塩液	250 mL						

レジメンNo.	92 BRECO10	<u>ドセタキセル療法</u>	適応病名: 乳がん						
		診療科: 乳腺・内分泌外科	根拠文献:						
		1コースの日数: 21日	最大コース数:						
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day			
						1	2	3	4
1	制吐剤	デキサメタゾン注	13.2 mg	点滴静注	30 min	○			
		生理食塩液	100 mL						
2	抗がん剤	ドセタキセル注	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60 min	○			
		5%ブドウ糖注射液	250 mL						
						day			
						1	2	3	4
3	制吐剤	デキサメタゾン錠	8 mg/回	経口	1日2回		○	○	○

レジメンNo.	92 BRECO11	<u>ビノレルビン療法</u>	適応病名: 乳がん	
		診療科: 乳腺・内分泌外科	根拠文献:	

1コースの日数： 21日

最大コース数：

Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day	
						1	8
1	制吐剤	デキサメタゾン注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 min	○	○
2	抗がん剤	ビノレルビン注 生理食塩液	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	5 min以内	○	○

レジメンNo.

92 BRECO12

weekly トラスツズマブ療法

適応病名: 乳がん

診療科: 乳腺・内分泌外科

根拠文献:

1コースの日数: 7日

最大コース数:

Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day	
						1	
1	抗がん剤	トラスツズマブ注(遺伝子組換え) 生理食塩液	4mg/kg(初回) 2mg/kg(2回目以降) 250 mL	点滴静注	90 min(初回) 30 min(2回目以降)	○	

レジメンNo.

92 BRECO14

tri-weekly トラスツズマブ療法

適応病名: 乳がん

診療科: 乳腺・内分泌外科

根拠文献:

1コースの日数: 21日

最大コース数:

Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day	
						1	
1	抗がん剤	トラスツズマブ注(遺伝子組換え) 生理食塩液	8 mg/kg(初回) 6 mg/kg(2回目以降) 250 mL	点滴静注	90 min(初回) 30 min(2回目以降)	○	

レジメンNo.

92 BRECO16

ゲムシタビン療法

適応病名: 乳がん

診療科: 乳腺・内分泌外科

根拠文献:

1コースの日数: 21日

最大コース数:

Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day	
						1	8
1	制吐剤	デキサメタゾン注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 min	○	○
2	抗がん剤	ゲムシタビン注 5%ブドウ糖注射液	1250 mg/m <sup>2</sup> 100 mL	点滴静注	30 min	○	○

レジメンNo.	92 BRECO21	<u>ビノレルビン+トラスツズマブ療法</u>	適応病名: 乳がん						
		診療科: 乳腺・内分泌外科	根拠文献:						
		1コースの日数: 21日	最大コース数:						
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day	1	8	15
1	制吐剤	デキサメタゾン注 生理食塩液	13.2 mg 100 mL	点滴静注	30 min		○	○	
2	抗がん剤	ビノレルビン注 生理食塩液	25 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	点滴静注	5 min以内		○	○	
3	抗がん剤	トラスツズマブ注(遺伝子組換え) 生理食塩液	4 mg/kg(初回) 2 mg/kg(2回目以降) 250 mL	点滴静注	90 min(初回) 30 min(2回目以降)	○		○	○

レジメンNo.	92 BRECO23	<u>ゲムシタビン+トラスツズマブ療法</u>	適応病名: 乳がん						
		診療科: 乳腺・内分泌外科	根拠文献:						
		1コースの日数: 21日	最大コース数:						
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day	1	8	15
1	制吐剤	デキサメタゾン注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 min		○	○	
2	抗がん剤	ゲムシタビン注 5%ブドウ糖注射液	1200 mg/m <sup>2</sup> 100 mL	点滴静注	30 min		○	○	
3	抗がん剤	トラスツズマブ注(遺伝子組換え) 生理食塩液	4 mg/kg(初回) 2 mg/kg(2回目以降) 250 mL	点滴静注	90 min(初回) 30 min(2回目以降)	○		○	○

レジメンNo.	92 BRECO25	<u>毎週イリノテカン療法</u>	適応病名: 乳がん						
		診療科: 乳腺・内分泌外科	根拠文献:						
		1コースの日数: 35日	最大コース数:						
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day	1	8	15
1	制吐剤	グラニセトロンバッグ	3 mg	点滴静注	15 min		○	○	○
2	抗がん剤	イリノテカン注 5%ブドウ糖注射液	100 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	90 min		○	○	○

レジメンNo.	92 BRECO26	TC療法	適応病名: 乳がん						
		診療科: 乳腺・内分泌外科	根拠文献:						
		1コースの日数: 21日	最大コース数: 4コース						
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day			
						1	2	3	4
1	制吐剤	デキサメタゾン注 生理食塩液	13.2 mg 100 mL	点滴静注	30 min	○			
2	制吐剤	グラニセトロン注	3 mg	点滴静注	15 min	○			
3	抗がん剤	ドセタキセル注 5%ブドウ糖注射液	75 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	60 min	○			
4	抗がん剤	シクロホスファミド注 生理食塩液	600 mg/m <sup>2</sup> 100 mL	点滴静注	30 min	○			
						day			
						1	2	3	4
5	制吐剤	デキサメタゾン錠	8 mg/回	経口 1日2回			○	○	○

レジメンNo.	92 BRECO29	エリブリン療法	適応病名: 乳がん				
		診療科: 乳腺・内分泌外科	根拠文献:				
		1コースの日数: 21日	最大コース数:				
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day	
						1	8
1	制吐剤	デキサメタゾン注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 min	○	○
2	抗がん剤	エリブリン注 生理食塩液	1.4 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	点滴静注	5 min以内	○	○

レジメンNo.	92 BRECO30	ペバシズマブ+パクリタキセル療法	適応病名: 乳がん					
		診療科: 乳腺・内分泌外科	根拠文献:					
		1コースの日数: 28日	最大コース数:					
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day		
						1	8	15
1	抗がん剤	ペバシズマブ注(遺伝子組換え) 生理食塩液	10 mg/kg 100 mL	点滴静注	90 min(初回) 60 min(2回目) 30 min(3回目以降)	○		○
2	制吐剤	デキサメタゾン注 ファモチジン注	6.6 mg 20 mg	点滴静注	30 min	○	○	○

	d-クロルフェニラミン注	5 mg						
	生理食塩液	100 mL						
3	抗がん剤	パクリタキセル注	90 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60 min	○	○	○
		生理食塩液	250 mL					

レジメンNo.	92 BRECO31	ペルツズマブ+トラスツズマブ+ドセタキセル療法			適応病名: 乳がん				
		診療科: 乳腺・内分泌外科			根拠文献:				
		1コースの日数: 21日			最大コース数:				
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day			
						1	2	3	4
1	抗がん剤	ペルツズマブ注(遺伝子組換え)	840 mg/body(初回)	点滴静注	60 min(初回)	○			
			420 mg/body(2回目以降)		30 min(2回目以降)				
		生理食塩液	250 mL						
2	抗がん剤	トラスツズマブ注(遺伝子組換え)	8 mg/kg(初回)	点滴静注	90 min(初回)	○			
			6 mg/kg(2回目以降)		30 min(2回目以降)				
		生理食塩液	250 mL						
3	制吐剤	デキサメタゾン注	13.2 mg	点滴静注	30 min	○			
		生理食塩液	100 mL						
4	抗がん剤	ドセタキセル注	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60 min	○			
		5%ブドウ糖注射液	250 mL						
						day			
						1	2	3	4
5	制吐剤	デキサメタゾン錠	8 mg/回	経口	1日2回		○	○	○

レジメンNo.	92 BRECO35	トラスツズマブ エムタンシン療法			適応病名: 乳がん				
		診療科: 乳腺・内分泌外科			根拠文献:				
		1コースの日数: 21日			最大コース数:				
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day			
						1			
1	抗がん剤	トラスツズマブ エムタンシン注	3.6 mg/kg	点滴静注	90 min(初回)	○			
		(遺伝子組換え)			30 min(2回目以降)				
		生理食塩液	250 mL						

レジメンNo.	92 BRECO36	エリブリン+トラスツズマブ療法			適応病名: 乳がん			
		診療科: 乳腺・内分泌外科			根拠文献:			
		1コースの日数: 21日			最大コース数:			

Rp 分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day		
					1	8	15
1 制吐剤	デキサメタゾン注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 min	○	○	
2 抗がん剤	エリブリン注 生理食塩液	1.4 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	点滴静注	5 min以内	○	○	
3 抗がん剤	トラスツマブ注(遺伝子組換え) 生理食塩液	8 mg/kg(初回) 6 mg/kg(2回目以降) 250 mL	点滴静注	90 min(初回) 30 min(2回目以降)	○		

レジメンNo.	92 BRECO38	Dose-Dense AC療法	適応病名: 乳がん			
		診療科: 乳腺・内分泌外科	根拠文献: J Clin Oncol. 2003 21(8):1431-1439			
		1コースの日数: 14日	最大コース数: 4コース			
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day
						1 2 3 4
1	制吐剤	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注	15 min	○
		デキサメタゾン注	6.6 mg			
2	抗がん剤	ドキシソルピシン注	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15 min	○
		生理食塩液	50 mL			
3	抗がん剤	シクロホスファミド注	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30 min	○
		生理食塩液	100 mL			
4	G-CSF	PEG-フィルグラスチム		皮下注		
						day
						1 2 3 4
5	制吐剤	アプレピタントカプセル	125 mg/回	経口 1日1回		○
6	制吐剤	アプレピタントカプセル	80 mg/回	経口 1日1回		○ ○
7	制吐剤	デキサメタゾン錠	4 mg/回	経口 1日2回		○ ○ ○

レジメンNo.	92 BRECO39	Dose-Dense パクリタキセル療法	適応病名: 乳がん			
		診療科: 乳腺・内分泌外科	根拠文献:			
		1コースの日数: 14日	最大コース数: 4コース			
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day
						1
1	制吐剤	デキサメタゾン注	13.2 mg	点滴静注	30 min	○
	抗アレルギー	ファモチジン注	20 mg			○
	抗アレルギー	d-クロルフェニラミン注	5 mg			○
		生理食塩液	100 mL			
2	抗がん剤	パクリタキセル注	175 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180 min	○
		生理食塩液	500 mL			

レジメンNo.	92 BRECO40	ペルツズマブ+トラスツズマブ+パクリタキセル療法	適応病名: 乳がん			
		診療科: 乳腺・内分泌外科	根拠文献:			
		1コースの日数: 21日	最大コース数:			
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day
						1 8 15
1	抗がん剤	ペルツズマブ注(遺伝子組換え)	840 mg/body(初回)	点滴静注	60 min(初回)	○
			420 mg/body(2回目以降)		30 min(2回目以降)	



2	抗がん剤	生理食塩液	250 mL	点滴静注	90 min(初回)	○		
		トラスツズマブ注(遺伝子組換え)	8 mg/kg(初回) 6 mg/kg(2回目以降)					
3	制吐剤	生理食塩液	250 mL	点滴静注	30 min	○	○	○
		デキサメタゾン注	6.6 mg					
		抗アレルギー - ファモチジン注	20 mg					
	抗アレルギー - d-クロルフェニラミン注	5 mg						
4	抗がん剤	生理食塩液	100 mL	点滴静注	60 min	○	○	○
		パクリタキセル注	80 mg/m <sup>2</sup>					
		生理食塩液	250 mL					

レジメンNo.	92 BRECO42	トラスツズマブ デルクステカン療法	適応病名: 乳がん						
		診療科: 乳腺・内分泌外科	根拠文献:						
		1コースの日数: 21日	最大コース数:						
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day			
						1			
1	制吐剤	デキサメタゾン注	6.6 mg	点滴静注	15 min	○			
		グラニセトロン注	3 mg						
2	抗がん剤	トラスツズマブ デルクステカン注	5.4 mg/kg	点滴静注	90 min(初回)	○			
		(遺伝子組換え)							
		5%ブドウ糖注射液	100 mL						

レジメンNo.	92 BRECO43	アテゾリズマブ+アルブミン懸濁型パクリタキセル療法	適応病名: 乳がん						
		診療科: 乳腺・内分泌外科	根拠文献:						
		1コースの日数: 28日	最大コース数:						
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day			
						1	8	15	
1	抗がん剤	アテゾリズマブ注(遺伝子組換え)	840 mg/body	点滴静注	60 min(初回)	○		○	
		生理食塩液	250 mL						30 min(2回目以降)
2	抗がん剤	アルブミン懸濁型パクリタキセル注	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30 min	○	○	○	
		生理食塩液	50 mL						

レジメンNo.	92 BRECO44	ペムプロリズマブ+ゲムシタビン+カルボプラチン療法	適応病名: 乳がん						
		診療科: 乳腺・内分泌外科	根拠文献:						
		1コースの日数: 21日	最大コース数:						
Rp	分類	薬剤名	投与量	投与方法	点滴時間	day			

