

レジメンNo.	20 GLI0006	ベバシズマブ+テモゾロミド療法(維持療法期)	適応病名: 悪性黒色腫
		診療科: 脳神経外科	根拠文献: N Engl J Med 370(8): 709-722 (2014)
		1コースの日数: 28 日	最大コース数: 6 コース
Rp 分類	薬剤名	投与量	投与方法 点滴時間 day
			1
1 抗がん剤	ベバシズマブ注 (遺伝子組換え) 生理食塩液	10 mg/kg 100 mL	点滴静注 30 min ○ (初回は90min, 2回目は60min)
			day
			1 ... 5
2 抗がん剤	テモゾロミドカプセル	day1から5まで 150~200 mg/m <sup>2</sup>	経口 1日1回 空腹時 ○ ○ ○
		1コース目:150mg/m <sup>2</sup> 、次コース以降忍容性問題なければ200mg/m <sup>2</sup> に増量	

レジメンNo.	20 GLI0007	ベバシズマブ療法	適応病名: 悪性黒色腫
		診療科: 脳神経外科	根拠文献: N Engl J Med 370(8): 709-722 (2014)
		1コースの日数: 21 日	最大コース数: なし
Rp 分類	薬剤名	投与量	投与方法 点滴時間 day
			1
1 抗がん剤	ベバシズマブ注 (遺伝子組換え) 生理食塩液	15 mg/kg 100 mL	点滴静注 30 min ○ (初回は90min, 2回目は60min)
		維持療法後の単剤療法期レジメン	