

レジメンNo.	42 ESOC002	<u>ネダプラチン+フルオロウラシル療法 (外来用)</u>	適応病名: 食道がん
		診療科: がん化学療法科	根拠文献:
		1コースの日数: 28日	最大コース数: なし
Rp 分類	薬剤名	投与量	投与方法 点滴時間 day
			1
1 補液	ラクテック注	500 mL	点滴静注 120 min ○
2 制吐剤	グラニセロン注バック	3 mg	点滴静注 15 min ○
3 抗がん剤	ネダプラチン注	100 mg/m ²	点滴静注 120 min ○
	生理食塩液	500 mL	
4 抗がん剤	フルオロウラシル注	2500 mg/m ²	持続点滴 120 h ○
	生理食塩液	インフューザーポンプに全量240mLとなるように調節	
5 補液	ラクテック注	500 mL	点滴静注 120 min ○

レジメンNo.	42 ESOC003	<u>ネダプラチン+ドセタキセル療法</u>	適応病名: 食道がん
		診療科: がん化学療法科	根拠文献:
		1コースの日数: 28日	最大コース数: なし
Rp 分類	薬剤名	投与量	投与方法 点滴時間 day
			1 15
1 制吐剤	グラニセロン注バック	3 mg	点滴静注 15 min ○ ○
	制吐剤 デキサメタゾン注	6.6 mg	○ ○
2 抗がん剤	ネダプラチン注	80 mg/m ²	点滴静注 120 min ○
	生理食塩液	500 mL	
3 抗がん剤	ドセタキセル注	30 mg/m ²	持続点滴 90 min ○ ○
	5%ブドウ糖液	250 mL	
4 補液	ラクテック注	500 mL	点滴静注 120 min ○

レジメンNo.	42 ESOC004	<u>ドセタキセル療法</u>	適応病名: 食道がん
		診療科: がん化学療法科	根拠文献:
		1コースの日数: 21日	最大コース数: なし
Rp 分類	薬剤名	投与量	投与方法 点滴時間 day
			1
1 制吐剤	グラニセロン注バック	3 mg	点滴静注 15 min ○
	デキサメタゾン注	6.6 mg	○
2 抗がん剤	ドセタキセル注	70 mg/m ²	点滴静注 60 min ○
	5%ブドウ糖液	250 mL	

レジメンNo.	42 ESOC009	<u>パクリタキセル療法</u>	適応病名: 食道がん
		診療科: がん化学療法科	根拠文献:
		1コースの日数: 49日	最大コース数: なし
Rp 分類	薬剤名	投与量	投与方法 点滴時間 day
			1 8 15 22 29 36
1 制吐剤	グラニセロン注バック	3 mg	点滴静注 15 min ○ ○ ○ ○ ○ ○
	抗アルギン酸 ファモチジン注	20 mg	○ ○ ○ ○ ○ ○
	抗アルギン酸 d-クロルフェニラミン注	5 mg	○ ○ ○ ○ ○ ○
	制吐剤 デキサメタゾン注	6.6 mg	○ ○ ○ ○ ○ ○
2 抗がん剤	パクリタキセル注	100 mg/m ²	点滴静注 90 min ○ ○ ○ ○ ○ ○
	5%ブドウ糖液	250 mL	

レジメンNo.	42 ESOC012a	<u>ニボルマブ療法 (4週間毎)</u>	適応病名: 食道がん
	42 ESOC014	診療科: がん化学療法科	根拠文献:
		1コースの日数: 28日	最大コース数: なし
Rp 分類	薬剤名	投与量	投与方法 点滴時間 day
			1
1 抗がん剤	ニボルマブ注 (遺伝子組換え)	480 mg/body	点滴静注 30 min ○
	生理食塩液	50 mL	

レジメンNo.	42 ESOC017	<u>ニボルマブ+イビリムマブ療法</u>	適応病名: 食道がん
		診療科: がん化学療法科	根拠文献:
		1コースの日数: 42日	最大コース数: なし
Rp 分類	薬剤名	投与量	投与方法 点滴時間 day

					1	15	29	
1	抗がん剤	ニボルマブ（遺伝子組換え）	240 mg/body	点滴静注	30 min	○	○	○
		生理食塩液	50 mL					
3	抗がん剤	イピリムマブ（遺伝子組換え）	1 mg/kg	点滴静注	30 min	○		
		生理食塩液	50 mL					
